

Arekovité, palmy

(*Arecaceae*)

stromy nebo liány s článkovaným kmenem pokrytým zbytky listových pochev, bez druhotného tloustnutí, většinou nevětveným

LISTY: řapíkaté, ve vrcholových chocholech

- v mládí celistvé, později se podle žilek dlanitě nebo zpeřeně trhají

KVĚTY:

⊕ nebo ↓ většinou ♀ a ♂ P 3+3 A 3+3 G (3) n. 3

- jednodomé či dvoudomé

- drobné, v klasovitých latách nebo palicích

PLOD: bobule nebo peckovice

ZÁSTUPCI:

datlovník pravý, palma datlová (*Phoenix dactylifera*)

kokosovník ořechoplodý (*Cocos nucifera*)

olejnice guinejská, palma olejová (*Elaeis guineensis*)

gomut cukrodárný (*Arenga saccharifera*)

rotan rákosovitý (*Calamus rotang*)

areka obecná (*Areca catechu*)

žumara nízká (*Chamaerops humilis*)


Washingtonia, *Livistona*, *Metroxylon*,
Trachycarpus, *Howea*, *Sabal* aj.

datlovník pravý, palma datlová (*Phoenix dactylifera*)



kokosovník ořechoplodý (*Cocos nucifera*)





**olejnice guinejská, palma
olejová (*Elaeis guineensis*)**




gomut cukrodárný (*Arenga saccharifera*)



rotan rákosovitý (*Calamus rotang*)



areka obecná (*Areca catechu*)





žumara nízká
(*Chamaerops humilis*)

