

ČELEĎ: šáchorovité (Cyperaceae)

jednoleté, dvouleté i vytrvalé byliny trávovitého vzhledu

LISTY:


- čárkovité, ploché až žlábkovité
- trojřadě uspořádané na trojhranném, plném stonku
- někdy redukováné v pochvy, vláknitě či síťovitě rozpadavé
- zpravidla obsahují SiO_2 - drsné

KVĚTY:

⊕ oboupohl. nebo ♀ a ♂ P 0 A G (2-3)

- okvětí redukováno v šupiny nebo chlupy, často chybí
- drobné, v kláscích tvořících klasovitá květenství

PLOD: nažka, u rodu *Carex* obalená srostlým měchýřkovitým listenem (mošnička)



STEJNOKLASÉ OSTŘICE = syn. **TUŘICE** = na vrcholu lodyhy několik oboupohlavných klasů

ostřice třeslicovitá
(*Carex brizoides*)



ostřice zaječí
(*Carex leporina*)



ostřiceměkkoostenná
(*Carex muricata*)



RŮZNOKLASÉ = OSTŘICE = klásky většinou jednopohlavné, na konci lodyhy bývají prašníkové klasy, pod nimi v úžlabí listenů samičí klasy

ostřice černá, obecná
(*Carex nigra*, *C. fusca*)




ostřice lesní
(*Carex sylvatica*)



ostřice srstnatá
(*Carex hirta*)



ostřice prstnatá
(*Carex digitata*)



ostřice chlupatá
(*Carex pilosa*)



ostřice štíhlá
(*Carex gracilis*)



ostřice měchýřkatá
(*Carex vesicaria*)




ostřice zobánkatá
(*Carex rostrata*)



skřípina lesní
(*Scirpus sylvaticus*)




bahnička bahenní
(*Eleocharis palustris*)



kamyšník přímořský
(*Bolboschoenus maritimus*)



skřípíneček jezerní
(*Schoenoplectus lacustris*)



suchopýr pochvatý
(*Eriophorum vaginatum*)



suchopýr úzkolistý
(*Eriophorum angustifolium*)



šáchor (*Cyperus*)