



10/13

# Tlak a vítr





# Tlak vzduchu

Síla vyvolaná tíhou ( $1,3 \text{ kg.m}^{-3}$ )

Torricelliho pokus

$\Rightarrow p_a = p_h = \rho h g$  (hustota  $\times$  rozdíl výšky  $\times$  tíhové zrychlení)

$\Rightarrow p_a = p_h = 13500 \text{ kg.m}^{-3} \times 760 \text{ mm} \times 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

**Kdyby s vodou (hustota  $1000 \text{ kg/m}^3$ )**


**pak by byla nutná  $14 \text{ m}$  hadice)**

**příčina: nižší hustota vody**

Jednotky:

$\Rightarrow 1 \text{ mm Hg (torr)} = 1,333 \text{ hPa}$

$\Rightarrow 1 \text{ bar} = 1 \text{ atmosféra} = 760 \text{ torr} = 100\,000 \text{ Pa}$






# Charakteristiky tlaku


- Normální tlak: 1013,25 hPa; 15 °C; 0 m n. m, 45 °s.š.
- Isobary
- Horizontální tlakový gradient
- Vertikální tlakový gradient



# Isobary



# Isobary a vítr






# Horizontální tlakový gradient

$F_h$

- Horizontální pohyb vzduchu - vítr







# Vertikální barický gradient

- Změna tlaku s výškou
- Atmosférický tlak klesá s nadmořskou výškou
- $12,5 \text{ hPa} / 100 \text{ m}$



# Příklad výpočtu změny tlaku





# Bioklimatologický význam tlaku


- u rostlin
  - ⇒ (Evapo)transpirace
- u zvířat
  - ⇒ **stenobarní** = nesnášejí větší kolísání tlaku, jsou vázáni na určitou výškovou zónu (hlavně savci a většina ptáků)
  - ⇒ **cerybarní** = tolerují snížení tlaku i rychlé změny tlaku především bezobratlí; mnohý krev sající hmyz je při snížení tlaku (před bouřkou) aktivnější a agresivnější (někteří ptáci – kondor)
- u člověka (stenobarní – individuální reakce!!)



# Vítr

$F_h$

## ➤ Horizontální pohyb vzduchu - vítr






# SÍLY OVLIVŇUJÍCÍ

1. Coriolisova síla
2. Zdánlivá síla odstředivá
3. Síla tření



# Coriolisova síla





# Coriolisova síla


$$Fc = 2 m \omega v \sin \varphi$$

- m – hmotnost tělesa
- $\omega$  - úhlová rychlosť zemské rotacie
- v - rychlosť pohybujúcí se častice
- $\varphi$  - zemepisná šířka




# Funkce sinus

$$Fc = 2 m \omega v \sin \varphi$$





# Coriolisova síla






# Odstředivá síla

$$Fo = m \frac{v^2}{r}$$



# Odstředivá síla





# Síla tření

$$F_t = -k m v$$

- k- koeficient tření
- proti směru pohybu



# Síla třecí a výsledný směr větru

F<sub>o</sub>


F<sub>h</sub>

F<sub>c</sub>

F<sub>t</sub>

Výsledný směr

995 hPa



1000 hPa




# Charakteristiky větru

- směr
- rychlosť
- nárazovitost



# Směr větru – odkud!!





# Rychlosť větru

➤ m.s<sup>-1</sup>

➤ km.h<sup>-1</sup>

➤ knots

⇒ ( 1 kn = 0,51 m.s<sup>-1</sup> = 1852 m / 3 600s =  
námořní míle/hod)

➤ °B



# Beaufortova stupnice

## BEAUFORTOVA STUPNICE

STUPEŇ	RYCHLOST (m · s <sup>-1</sup> )	OZNACĚNÍ
0	0,0 - 0,2	BEZVĚTRÍ
1	0,3 - 1,5	VÁNEK
2	1,6 - 3,3	SLABÝ VÍTR
3	3,4 - 5,4	MÍRNÝ VÍTR
4	5,5 - 7,9	DOSTI ČERSTVÝ VÍTR
5	8,0 - 10,7	ČERSTVÝ VÍTR
6	10,8 - 13,8	SILNÝ VÍTR
7	13,9 - 17,1	PRUDKÝ VÍTR
8	17,2 - 20,7	BOUŘLIVÝ VÍTR
9	20,8 - 24,4	VICHŘICE
10	24,5 - 28,4	SILNÁ VICHŘICE
11	28,5 - 32,6	MOHUTNÁ VICHŘICE
12	> 32,7	ORKÁN




Stupeň 6




# Beaufortova stupnice - účinky

*Level 2*



*Level 6*





# Nárazovitost

- zvýšení rychlosti alespoň o 5 m/s po dobu alespoň 1s avšak nejvýše 20 s
- Nejnižší stanovená hranice je 12 m/s.



# Nárazy - 30.1.2022



## Sněžka

nej silnější náraz  
52 m/s  
186 km/h



## Milešovka

nej silnější náraz  
40 m/s  
144 km/h



## Ústí nad Labem, Kočkov

nej silnější náraz  
28 m/s  
101 km/h



## Praha

nej silnější náraz  
27 m/s  
96 km/h

**Velmi silný vítr při orkánu Nadia (Malik)**

**zdroj: ČHMÚ**



# Typická větrná proudění

*(reliéf, kontakt vzduchových hmot, změna aktivního povrchu, apod.)*


- Fén
- Cyklóny, tajfuny, uragány, hurikány
- Tornádo (tromba, smrště)
- Bríza (pobřežní vánky)
- Údolní x horský vítr
- Monzuny
- Jugo, bóra (Chorvatsko)
- Mistrál, chamsín, scirocco, blizard....



# Příklady



**Hurikán Helen**



$5 - 10^{\circ}$  s nebo j šířky


teplota vody alespoň  $26^{\circ}\text{C}$

vysoká vlhkost

vyšší rychlosť větru



# Hurikány na rovníku?





# Tornádo - vznik?!



**Není zcela popsán (proto se nedá předpovědět)**

- **Supercela** – často izolovaný Cb (bouřka)
- **Vertikální proudy**
- **Stříh větru** (točivý vír v různých výškách s různou rychlostí)



Supercela nad  
Pálavou Foto:  
Lukáš Valian  
26.6.2020

## Lovec tornád



# Tornadojägaren

Text och foto:  
Micke Karlsson

Ken Deweys jobb är att finna tecken på en kommande tornado. Han är specialist på att hitta dem. Det finns bara ett problem.

– Amerikaner tycker generellt sett att all skatt är bortkastade pengar så de flesta begriper inte att det jobb vi gör faktiskt sparar skattepengar i det långa loppet...

**M**änniskor som aldrig upplevt en tornado kan nog inte riktigt förstå den enorma urkraft som naturen visar upp när den är på sitt mest destruktiva humör.

En av dem som vet betydligt mer om denna urkraft, och dess potentella destruktivitet, är professor Ken Dewey vid den geologiska/meteorologiska fakulteten på University of Nebraska i delstatshuvudstaden Lincoln.

– Många tror att det är spännande att jaga stormar men det är faktiskt mer skrämmande än någonting annat. När man står där, mitt ute i naturen, och får uppleva naturens urkraft nära in på insen man hur liten man egentligen är, säger Ken när Seko-magasinet träffar honom i Lincoln, och fort sätter:

### Folk begriper inte riskerna

– Som med allting annat som är farligt tycker allmänheten att stormar, och främst tornader, är raff-

lande. Folk begriper nog inte riktigt riskena efter som de allra flesta säger att de gärna vill se en tornado på nära håll.

Ken Dewey skakar på huvudet och fortsätter:

– Tack vare all den forskning som har gjorts kring tornader och allvarliga stormar de senaste åren har vi numera möjligheter att varna folk i tid om en tornado är på väg mot dem. Fast det är klart, om folk ignoreras varningarna och går utomhus för att titta på tornaden i stället för att söka skydd, spelar det ju ingen roll hur långt vi förråg vi kan varna.

### F5 är värsta sorten

Tornader bedöms i den så kallade Fujitaskalan. Den spänner från F0 till F5, där F5 är den värsta sortens tornado. En F5:a har vindhastigheter mellan cirka 18–32 meter per sekund och en F5:a blåser på i 117–141 meter per sekund.

Det finns två sorters varningar när det handlar om att varna allmänheten för en kommande tornado. "Watch" respektive "Warning". Watch utfärdas när riskena är stora för en nära förestående tornado och

### Vad är en tornado?

En tornado är i princip en virvelvind. Rotationen sker vanligen motsols. Diametern på en tornado kan variera från 100 meter till 600 meter, men det förekommer tornader som har en diameter på en meter och det har förekommit tornader med en diameter på smärt otroliga en och en halv kilometer.

Tornader bildas inuti, framför eller bakom ett åsksystem. I korthet handlar det om att olika lufttemperaturer inom samma system på olika höjdutvärder tvingar luften att sliga respektive sjunka. Om förhållandena är de rätta kan en cyklonisk rotation uppstå.


Vanliga tecken på en tornado är att himlen mörknar, att temperaturen sjunker en aning och flera mindre molntappar som hänger ned på undersidan av ett åskmoln. När dessa molntappar börjar rotera, och rotationen ökar hastighet, sjunker de ned mot marken och en tornado har fötts.

– Vi vet så otroligt mycket mera om tornader idag jämfört med för bara tio år sedan, säger professor Ken Dewey. Åndå går det inte att förutse vilken väg en tornado skall ta, vilket gör den extremt farlig, särskilt för turister på tornadasafari.

# Výzkum




# Tornádo







# Tornáda 1980-2000





Treynor, Iowa, 16 .5 1999.

někde v Kansasu, 1989.




Grand Island,  
3.6. 1980.



# Fujitova stupnice

## KLASIFIKACE TORNÁD PODLE SÍLY – FUJITOVA STUPNICE (F)

Označení	Rychlosť tornáda (km/h)	Efekt
F0	do 117	Padají komíny, lámou se větve.
F1	117 až 180	Slabší tornádo, jehož výskyt můžeme objevit i v ČR.
F2	180 až 252	Vyvrací vysoké předměty, malé předměty létají.
F3	252 až 332	Odtrhává střechy a většina stromů je vyvrácena, jsou odmršťována i těžká auta.
F4	332 až 418	Velmi silný vír, jeho rychlosť ničí celé domy a může je i odnést.
F5	418 až 511	Nejsilnější forma tornáda, která nechává poletovat nejtěžší předměty a odmršťuje je do vzdálenosti 100m, svou silou vytrhává stromy i s kořeny.



Délka: 26 km, pás: 100-700 m



# Mikulčice 24.6.2021





# Mikulčice 26.6.2021









# Bríza - pobřežní vánky

The Thermal-Pressure Relationship







# Podobný princip




# Údolní a horský vítr (např. Mistral)






# Letní a zimní monzun



July



January



# Letní monzun




- **Silný vítr**
- **Přívalové srážky**
- **Sesuvy půdy**



# Chorvatsko



Bóra



Jugo



# Bioklimatologický význam větru

## POZITIVNÍ:

- **výměna vzduchu**
- **větrné opylení (anemofylie)**
- ➡ **Entomogamie – bylinky lákají hmyz na barvu, vůni, stromy nic takového**
- **přenášení semen a plodů (anemochorie)**
- **pohyb listů**
- **rozrušení inverzní vrstvy**
- **zdroj energie**




# Zdroj energie





# Větrná energie v ČR (minimum 4 m.s<sup>-1</sup>)

- 5 - 6 m.s<sup>-1</sup>
- > 6 m.s<sup>-1</sup>



- < 4 m.s<sup>-1</sup>
- 4 - 5 m.s<sup>-1</sup>



## Třídění Podle výkonu

Typ	Výkon VE (kW)
Malé	do 20
Střední	20 - 50
Velké	nad 50






# Bioklimatologický význam větru

## NEGATIVNÍ:

- **podporuje výpar**
- **přenášení škůdců a plevelů**
  - ⇒ Kůrovec 600 – 1500 m, ale s větrem i 13 km
- **odnáší sníh**
- **větrná eroze**
- **polomy – >10 st. °B**
- **vlajkové stromy**



**Území ohrožené větrnou erozí  
2000 – 10 % území ČR, 2023 = 25 % území**





# Větrná eroze





# Silné vichřice





# Vysoké Tatry 19.11.2004



- rychlosť  
až 170km/h
- 25 000 ha  
zničeno
- 12 000 ha  
poškozeno



# Ale i mírné vichřice cca 50 km/h

Škody ohryzem a loupáním: škody se projeví za 20 let, vysoká strhne kůru, strom je infikován houbami (nejen václavka) a začne v 50 letech černat v těch 6-15 metrůech – tmavé fleky na kmeni a pak přijde průměrný vítr a strom v 50 letech spadne...a pojďme se soudit, že před 30 lety nám jeleni poškodili (oloupali) strom...to je nesmysl...


Lov je základní pěstební opatření pro lesy

Pokud posílíme vlastnická práva u lovů pak si ten vlastník nemůže stěžovat, že mu to zvěř žere...

Nájemci jako myslivci jsou špatně - čekají na trofejní kus (kult trofejí) a co...Vrška: Slatiňany



# Kořenový problém odolnosti na vítr ???



- A – kůlový (borovice, douglaska, jedle dub letní)
- B – srdčitý = více šikmých (buk lesní)
- C – mělký = vodorovný (smrk)





# *Za týden: Předpověď počasí*