

# Škůdci řepky olejky

Ing. Eva Hrudová, Ph.D.

**Krytonosec šešulový**  
*Ceutorhynchus obstrictus*  
Výskyt: období tvorby šešulí.  
Škodí: larvy žírem na semenech v šešulích.  
Příznaky napadení: nenápadné, někdy patrný otvor.

**Zlatohlávek huňatý**  
*Tropinota hirta*  
Příležitostný škůdce květů.

**Mšice zelná**  
*Brevicoryne brassicae*  
Výskyt: celé vegetační období.  
Škodí: larvy a dospělci sáním na rostlinách.  
Příznaky napadení: kolonie mšic na nadzemních částech, žloutnutí listů, opad šešulí, rostliny pokryté medovicí a porostlé saprofytickými černěmi.

**Blýskáček řepkový**  
*Meligethes syn. Brassicogethes aeneus*  
Výskyt: od období tvorby pupat.  
Škodí: dospělci vyžíráním generativních orgánů, živí se pylem, larvy neškodí.  
Příznaky napadení: poškozená pupata, opad poškozených pupat.

Krytonosec čtyřzubý

**Krytonosec čtyřzubý**  
*Ceutorhynchus pallidactylus*  
**Krytonosec řepkový**  
*Ceutorhynchus napi*  
Výskyt: na jaře od teploty cca 5 °C.  
Škodí: larvy vyžíráním stonků.  
Příznaky napadení: deformace a praskání stonků.

**Bejlmorka kapustová**  
*Dasyneura brassicae*  
Výskyt: období tvorby šešulí.  
Škodí: larvy sáním v šešulích.  
Příznaky napadení: deformace a praskání šešulí.

**Dřepčík černý - Phyllotreta atra**  
**Dřepčík černonohý - P. nigripes**  
Výskyt: podzim až jaro.  
Škodí: dospělci žírem na listech, na srdčících.  
Příznaky napadení: vyslepnutí rostliny, okénka na listech.

**Krytonosec zelný**  
*Ceutorhynchus pleurostigma*  
Výskyt: podzim až pozdní jaro.  
Škodí: larvy tvorbou hálek na kořenech.  
Příznaky napadení: kulovité háčky na kořeni, na povrchu hladké, uvnitř s dutinou a larvou, napadení zvyšuje náchylnost k vyzimování.

**Dřepčík olejkový**  
*Psilliodes chrysocephala*  
Výskyt: podzim.  
Škodí: larvy minováním v listech a řapících, poškozují kořenový krček.  
Příznaky napadení: miny na listech, praskání řapíků, napadení zvyšuje náchylnost k vyzimování.

**Květilka zelná**  
*Ceutorhynchus pleurostigma*  
Výskyt: podzim až pozdní jaro.  
Škodí: larvy na kořenech.  
Příznaky napadení: rozpraskané kořeny, nafialovělé listy, někdy úhyn rostliny, napadení zvyšuje náchylnost k vyzimování.

**Pilatka řepková**  
*Athalia rosae*  
Výskyt: po celou dobu vegetace.  
Škodí: larvy žírem na listech, někdy i šešulích.  
Příznaky napadení: požerky na listech  
Škodí na podzim, jen v některých letech.

**Housenky mūr**  
*Noctuidae spp.*  
Výskyt: podzim až pozdní jaro.  
Škodí: housenky na listech, kořenových krčcích a kořenech.  
Příznaky napadení: požerky na listech, kořenových krčcích, poškození vede k zeslabení až úhynu rostliny.  
Škodí jen v některých letech.