



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Charakteristika bylin v travních porostech

Jiří Skládanka

Druh	Kh	H	N	R	M
Bedrník obecný (<i>Pimpinella saxifraga</i> L.)	5/4	3	2	7-5	1/-/1
Bika ladní (<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	2/1	3	1	5-6	
Bolševník obecný (<i>Heracleum sphondylium</i> L.)	5/3	4	5	5-7	3/-/2
Bršlice koží noha (<i>Aegopodium podagraria</i> L.)	3	5	4	7	
Černohlávek obecný (<i>Prunella vulgaris</i> L.)	2	4	1	5-7	2/-/2
Hadinec obecný (<i>Echium vulgare</i> L.)	-2	1	1	6-8	3/-/2
Hvozdík kartouzek (<i>Dianthus carthusianorum</i> L.)	2!	3	1	7-6	
Chrastavec rolní (<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.)	2	3	3	6-8	3/-/1
Chrpa čekánek (<i>Jacea scabiosa</i> Lam.)	3/2	2	2	6-7	3/-/2
Chrpa luční (<i>Jacea pratensis</i> Lam.)	3/2	5	3	6-7	3/-/2
Jahodník obecný (<i>Fragaria vesca</i> L.)	2	3	1	5-7	1/-/2
Jestřábník chlupáček (<i>Hieracium pilosella</i> L.)	2	3	1	6-8	2/-/2
Jestřábník myší ouško (<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.)	2	7	1	6-8	2/-/2
Jitrocel kopinatý (<i>Plantago lanceolata</i> L.)	6/4	4	3	5-8	-/-/3
Jitrocel prostřední (<i>Plantago media</i> L.)	2	3	2	7-6	-/-/2
Kakost luční (<i>Geranium pratense</i> L.)	2	4	4	7	3/-/2
Kmín kořený (<i>Carum carvi</i> L.)	5/3	4	4	6-7	2/-/1
Kohoutek luční (<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.)	1!	7	3	6-8	2/-/1
Kokrhel luštinec (<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich)	-3	3	3	7-5	
Kontryhel obecný (<i>Alchemilla vulgaris</i> L.e. S.E.Frohner)	5	4	3	5-7	
Kopretina bílá (<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.)	2	4	2	5-7	1/-/1
Kopřiva dvoudomá (<i>Urtica dioica</i> L.)	1!	6	5	6-8	
Kostival lékařský (<i>Symphytum officinale</i> L.)	2!	7	4	7-5	2/-/1
Krvavec menší (<i>Sanguisorba minor</i> Scop.)	4/3	2	1	7-8	-/-/1
Krvavec toten (<i>Sanguisorba officinalis</i> L.)	5/3	7	3	8-6	1/-/1
Lnice květel (<i>Linaria vulgaris</i> Mill.)	-2	3	4	7-6	2/-/2
Mateřídouška obecná (<i>Thymus vulgaris</i> L.)	1!	2	1	6-5	
Mochna husí (<i>Potentilla anserine</i> L.)	1!	7	4	8-6h	1/-/1
Mochna nátržník (<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.)	1!	4	1	5-7	2/-/1
Mrkev obecná (<i>Daucus carota</i> L.)	3/2	4	3	6-8	2/-/1
Ocún jesenní (<i>Colchicum autumnale</i> L.)	-4	6	3	6-7	2/-/2
Ostřice hnědá (<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard)	1!	9	2	6	
Ostřice jarní (<i>Carex caryophylla</i> Latourr.)	2!	2	1	6-8	
Ostřice liščí (<i>Carex vulpina</i> L.)	2!	7	4	6-8	
Ostřice nízká (<i>Carex humilis</i> Leyss.)	2!	1	1	6-8	
Ostřice ostrá (<i>Carex acutoformis</i> Ehrh.)	1!	8	3	6	
Pampeliška lékařská (<i>Taraxacum officinale</i> auct. Non Weber)	5/4	4	5	5-8	3/-/4
Pampeliška podzemní (<i>Leontodon autumnalis</i> L.)	5/4	4	3	5-7	2/-/1
Pastinák setý (<i>Pastinaca sativa</i> L.)	4/2	4	4	6-7	2/-/2
Pcháč bahenní (<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.)	0!	8	2	6-7	3/-/2
Pcháč zelinný (<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.)	4	7	3	6-7	3/-/2
Pomněnka bahenní (<i>Myosotis palustris</i> L.)	2	8	2	7-5	2/-/1
Popenec břechtanolistý (<i>Glechoma hederacea</i> L.)	-2	5	4	5-7	2/-/1
Pryskyřník plazivý (<i>Ranunculus repens</i> L.)	-1	7	4	6-8h	2/-/2
Pryskyřník prudký (<i>Ranunculus acris</i> L.)	-3	6	3	5-8h	1/-/2
Přýšec chvojka (<i>Euphorbia cyparissias</i> L.)	-3	1	1	6-8	
Přeslička bahenní (<i>Equisetum palustre</i> L.)	-4	8	2	5-7	
Rdesno hadí kořen (<i>Bistorta major</i> Gray)	4	6	3	8-6	3/-/2
Rdesno ptačí (<i>Polygonum aviculare</i> L.)	1!	5	4	8-6h	1/-/1
Rozrazil rezekvítek (<i>Veronica chamaedrys</i> L.)	2	4	3	7-5	1/-/1
Řebříček obecný (<i>Achillea millefolium</i> L.)	5/3	4	4	5-7	1/-/1
Řepík lékařský (<i>Agrimonia eupatoria</i> L.)	2	3	1	6-8	2/-/2
Řeřišnice luční (<i>Cardamine pratensis</i> L.)	-2	7	3	5-7	2/-/2
Sedmikráska chudobka (<i>Bellis perennis</i> L.)	2	4	3	5-7	2/-/1
Silenka obecná (<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke)	3/2	3	2	6-7	3/-/2
Sítina klubkatá (<i>Juncus conglomeratus</i> L.)	1!	8	2	5-6	
Starček přímětník (<i>Senecio jacobaea</i> L.)	-4	3	2	7-6	2/-/2
Svízel povázka (<i>Galium mollugo</i> L.)	3/2	4	4	5-7	1/-/1
Svízel syřišřový (<i>Galium verum</i> L.)	3/2	2	2	7-8	2/-/1
Šalvěj luční (<i>Salvia pratensis</i> L.)	2!	3	2	7	3/-/1
Škarda dvouletá (<i>Crepis biennis</i> L.)	4	4	4	6	1/-/1
Šťovík kadeřavý (<i>Rumex crispus</i> L.)	1!	8	5	6-8	
Šťovík kyselý (<i>Acetosella vulgaris</i> Fourr.)	2!	5	3	4-5	
Šťovík tupolistý (<i>Rumex obtusifolius</i> L.)	1!	6	5	6-8	
Třezalka tečkovaná (<i>Hypericum perforatum</i> L.)	-2	3	2	5-7	-/-/2
Tužebník jilmový (<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.)	3!	8	3	5-7	2/-/2
Vratič obecný (<i>Tanacetum vulgare</i> L.)	-3	3	2	5-7	2/-/1
Zběhovcov plazivý (<i>Ajuga reptans</i> L.)	2	6	3	5-8	2/-/1
Zvonek rozkladitý (<i>Campanula patula</i> L.)	3	4	3	6-7	2/-/2

Připraveno v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0020

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky