

## Vrba laponská

*Salix lapponum* L.

Stupeň ohrožení: C1

### POPIS

Vzpřímený keř 0,8-1,2(-1,5) m vys., s kmínky do 3 cm v průměru. Letorosty v mládí hustě chlupaté, později olysálé, stejně jako pupeny. Listy střídavé, čepel kopinatá až podlouhle kopinatá, 3-6 cm dl., téměř celokrajná, v mládí oboustranně hustě chlupatá, později na líci olysálá, matně zelená, na rubu šedozelená, stříbrošedě hustě chlupatá až plstnatá, řapík 4-10 mm dl., palisty malé, záhy opadavé. Samčí jehnědy válcovité, 3,0-3,5 cm dl., květy se 2 tyčinkami, nitky lysé. Samičí jehnědy 2,5-3,0 cm dl., semeník přitiskle chlupatý až plstnatý, čnělka až zdělí  $\frac{1}{2}$  semeníku, blizny vidličnaté, s čárkovitými rameny. Kvete před rašením listů.

### EKOLOGICKÉ NÁROKY

Vrba laponská je vlhkomilná a chladnomilná dřevina, snášející stagnující vodu. Osidluje subalpínská vrchoviště a křoviny, bažiny, vysokobylinné nivy, převážně na silikátových podkladech. Ve společenstvech svazu *Oxycocco-Empetrion hermaphroditi*.


### ROZŠÍŘENÍ

V ČR pouze v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. 45 % lokalit je v nadmořské výšce 1201-130 m, 30 % od 1301-1400 m, 13 % od 1401-1500 m.


Eurosibiřský druh: Skotsko, Skandinávský poloostrov, s. Evropa a Západní Sibiř, jižně v pohořích stř. Evropy – Francouzské středohoří, Sudety, Karpaty, Vitoša, Rila.

### PŘÍČINY OHROŽENÍ


V České republice silně ohrožený druh. K jeho poškození může dojít zimní turistikou, dále okusem vysokou zvěří a hybridizací se *Salix silesiaca*.



## Výskyt podle nadmořské výšky




Výskyt do roku 2000



počet lokalit    1    3    8    17

Výskyt po roce 2001



počet lokalit    1    9