

## Dub jadranský

*Quercus virgiliana* Ten.

Stupeň ohrožení: C1

### POPIS

Strom 10-20 m vys., se silnými, šedě plstnatými letorosty i pupeny. Listy nahloučené na konci letorostů, s čepelí široce obvejčitou až eliptickou, 6-14 cm dl., peřenoklanou až peřenodílnou, se 6-8 páry postranních žilek, s četnými interkalárními žilkami, na líci tmavozelenou, na rubu šedavě plstnatou, olysávající a sivě ojněnou. Žaludy 2-4 cm dl., na stopkách 1-5 cm dl., v polokulovité až nálevkovité tlustostěnné číšce, s šupinami vyklenutými až hrbatě ztlustlými.

### EKOLOGICKÉ NÁROKY

Dub jadranský je teplomilná a světlomilná dřevina. Vyskytuje se v teplomilných doubravách a lesostepních společenstvech, především na bazických podkladech. Ve společenstvech svazu *Quercion pubescenti-petraeae*.


### ROZŠÍŘENÍ

V ČR v panonském termofytiku na j. Moravě, zejména v Jihomoravské a Znojemsko-brněnské pahorkatině, Pavlovských vrších, ojediněle v Jihomoravském úvalu.


Těžiště rozšíření v jihovýchodní Evropě, od Korsiky a Sardínie přes Itálii a býv. Jugoslávii do Řecka, Bulharska, Rumunska, východně do Turecka a na Krym, jižně po Sicílii, na sever do Maďarska, České a Slovenské republiky a Rakouska.

### PŘÍČINY OHROŽENÍ

V České republice kriticky ohrožený druh.



Výskyt do roku 2000



počet lokalit 1 3

Výskyt po roce 2001

